

レジメン名	CDDP+S-1療法
-------	------------

1 クール	35 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(8)	day(9)	day(10)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		120分で					
		ソラセトF輸液 [500mL](ウィーンF)	1 袋				
	2	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		120分で					
		ソラセトF輸液 [500mL](ウィーンF)	1 袋				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		120分で					
		ソラセトF輸液 [500mL](ウィーンF)	1 袋				
		CDDP開始60分前にイモット [®] 内服					
	4	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		15 分で					
		○クラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](テカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](テカトロン)	2 管				
	5	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		120分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				
		○ススプラチン点滴静注50mg「マルコ」	60 mg /m ²				
		遮光、全量500mLとする。					
	6	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		90 分で					
		○20%マニトール注射液「YD」[300mL]	1 瓶				
	7	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定			
		120分で					
		ソラセトF輸液 [500mL](ウィーンF)	1 袋				

処方	8	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定		
		120分で				
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウイーンF)	1 袋			
						
	1			●		
		○イミドカブセル125mg	1 C			
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法当日、シスプラチン投与60分前に 内服。				
	2			●	→	
		○イミドカブセル80mg	1 C			
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目の、それぞれ朝食後内 服。				
	3			●	→	→
		○デカドロン錠4mg	2 錠			
コメント						
		S-1(80mg/m2)はday1-21服用、22-35休薬。 day9-11、デカドロン8mg 内服。				

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。