

レジメン名	RAM+PTX療法
-------	-----------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で					
		○グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		ファモチジン静注20mg[溶解液不要](カスター)	1 管				
		○ホパラミン注5mg	1 管				
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		60 分で					
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋				
		25mg/分を超えない速度で					
		○サイラムザ点滴静注液500mg	8 mg /kg				
		0.2μフィルター使用					
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		60 分で					
		ブトウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○ハブリタキセル点滴静注液 100mg「サント」(タキソール)	80 mg /m ²				
		PVCフリー、フィルター使用					
	5	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
		フラッシュ					
処方							
コメント							