

レジメン名	FP (700-70) +RT療法
-------	-------------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
注射								
	1	DIV 点滴注射			時間未定			
		メイン 120分で						
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウイーンF)	1 袋					
	2	DIV 点滴注射			時間未定			
		メイン 120分で						
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウイーンF)	1 袋					
		シス投与60分前イミド内服						
	3	DIV 点滴注射			時間未定			
		メイン 15 分で						
		○ケラニセトロン点滴静注パック1mg/50mL「テバ」	1 袋					
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶					
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管					
	4	DIV 点滴注射			時間未定			
		メイン 120分で						
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋					
		全量500mL						
		○シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	70 mg /m ²					
		遮光						
	5	DIV 点滴注射			時間未定			
		メイン 翌朝まで ワンバック ホウフ使用						
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウイーンF)	2 袋					
		フリンヘラン注射液10mg	2 管					
		○フルオロウラル注1000mg「トーワ」	700 mg /m ²					
	6	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定	時間未定
		メイン 24 時間で ワンバック ホウフ使用						
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウイーンF)	2 袋					
		フリンヘラン注射液10mg	2 管					
		○フルオロウラル注1000mg「トーワ」	700 mg /m ²					

注射	7	DIV 点滴注射			時間未定		
		5FU投与の側管より 180分で					
		○20%マンニトール注射液「YD」[300mL]	1 瓶				
	8	DIV 点滴注射			時間未定		
		側管 120分で					
		ソラセトF輸液 [500mL](ウイーンF)	1 袋				
	9	DIV 点滴注射(速度指示)					時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
処方		メインのフラッシュ					
							
	1				●		
		○イミダゾピペリドール125mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法1日目、シスプラチン投与の60分前 に内服。					
	2				●	→	
		○イミダゾピペリドール80mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目、それぞれ朝食後に内 服。					
	3				●	→	→
コメント		○デカドロン錠4mg	2 錠				
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法開始2日目から内服					
コメント		day2-4、デカドロン8mg内服。					

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。