

レジメン名	CBDCA+PTX (triweekly)療法
-------	-------------------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		30 分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサトロン注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	3 瓶			
		ファモチジン静注20mg[溶解液不要](カスター)	1 管			
		○ホ®ラミン注5mg	1 管			
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		180分で				
		ブト®糖注射液 5% [500mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○パ®リタキセル点滴静注液 100mg「サント」(タキノール)	180 mg /m <sup>2</sup>			
		PVCフリー・フィルター付セット使用				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		60 分で				
		ブト®糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○カルボ®ラチン点滴静注液450mg「サント」	6 mg /AUC× (GFR+25)			
処方	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		全開				
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶			
処方						
	1				●	→
		○デカトロン錠4mg	2 錠			
コメント		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
		day2-3、デカドロン8mg内服。 PTX: 175-180mg/m <sup>2</sup> 、CBDCA: AUC5-6				